

# **ANTIFUX 100 mg**

## **CÁPSULAS**

**ITRACONAZOL 100 mg**

### **COMPOSICIÓN**

Cada Cápsula de ANTIFUX contiene: Itraconazol 100 mg

Excipientes: sacarosa, hidroxipropilmetilcelulosa, almidón de maíz, eudragit E-100, Polietilenglicol, polivinilpirrolidona, cápsula de gelatina dura.

### **ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Antifúngico, Antimicótico.

### **INDICACIONES**

ANTIFUX está indicado para el tratamiento de infecciones fúngicas de la vagina, piel, boca, ojos, uñas y órganos internos.

El principio activo es itraconazol, medicamento perteneciente a la siguiente clase farmacoterapéutica: Antimicóticos para uso sistémico, derivados de triazol.

ANTIFUX es muy efectivo frente una variedad de infecciones causadas por levaduras y hongos.

Tiene gran afinidad por los tejidos queratinizados tales como piel y uñas, así como por la pared vaginal.

Los niveles terapéuticos de itraconazol permanecen en la piel durante dos a cuatro semanas tras acabar el tratamiento, dependiendo de su duración.

En el tejido vaginal, itraconazol se mantiene durante un período de dos a tres días, dependiendo de nuevo de la duración del tratamiento.

### **PRECAUCIONES**

Consulte a su médico antes de empezar a tomar si:

- Ha tenido alguna vez problemas de riñón. Su dosis de ANTIFUX puede ser modificada.
- Ha tenido alguna vez problemas hepáticos tales como piel amarilla (ictericia). Su dosis de ANTIFUX puede ser modificada.
- Si después de tomar este medicamento tiene falta severa de apetito, se siente enfermo (náuseas), está enfermo (vómitos), se siente inusualmente cansado, con dolor abdominal, debilidad muscular, color amarillo de la piel y del blanco de los ojos, orina inusualmente oscura, heces pálidas o caída de cabello, deje de tomar ANTIFUX cápsulas y consulte a su médico inmediatamente.
- Si ha tenido alguna vez problemas de corazón incluyendo insuficiencia cardíaca (insuficiencia cardíaca congestiva o ICC). ANTIFUX cápsulas podría empeorarla.
- Si después de tomar este medicamento le falta la respiración, gana peso de forma inesperada, tiene las piernas hinchadas, se siente inusualmente fatigado o comienza a despertarse por la noche, deje de tomar ANTIFUX cápsulas y consulte a su médico inmediatamente. Estos pueden ser signos de insuficiencia cardíaca.

**Niños y ancianos:**

ANTIFUX cápsulas no se administra normalmente a niños, ni en ancianos. Sin embargo, su médico puede prescribírselo en casos especiales.

**Análisis de sangre:**

Si toma ANTIFUX cápsulas durante más de un mes, su médico puede que quiera comprobar su hígado mediante un análisis de sangre.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

En particular, no tome ANTIFUX cápsulas y consulte a su médico si está tomando cualquier de los que se indican:

- Medicamentos para la fiebre del heno o la alergia, como terfenadina, astemizol o mizolastina.
- Medicamentos utilizados para bajar el colesterol, como atorvastatina, lovastatina o simvastatina.
- Medicamentos utilizados para el latido irregular del corazón, denominados quinidina o dofetilida.
- Medicamentos utilizados para tratar la angina (dolor de pecho opresor) hipertensión arterial, bepridil y nisoldipina.
- Medicamentos para las migrañas, eletriptan, dihidroergotamina y ergotamina.
- Cisaprida, para problemas digestivos.
- Ergometrina (ergonovina) y metil-ergometrina (metilergonovina) utilizados después de dar a luz.
- Levacetilmetadol, para el tratamiento de abuso de drogas (dependencia de opioide).
- Midazolam (oral) o triazolam, para la ansiedad o para ayudar a dormir.
- Pimozida y sertindol, medicamentos para alteraciones que afectan al pensamiento, sentimientos y comportamiento.

Consulte a su médico antes de tomar o si ya está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos. Pueden disminuir drásticamente la acción de ANTIFUX itraconazol:

- Medicamentos para la tuberculosis como rifampicina, rifabutin e isoniazida.
- Medicamento para la epilepsia como fenitoína, carbamazepina o fenobarbital.
- Hierba de San Juan (una hierba medicinal). No tome ANTIFUX cápsulas en 2 semanas desde que tome este medicamento
- Medicamentos para la indigestión, úlceras de estómago o acidez de estómago pueden afectar la producción de ácido del estómago. Debe haber el ácido suficiente en el estómago para asegurar que el organismo puede utilizar el medicamento. Por esta razón debe esperar dos horas después de tomar itraconazol antes de tomar cualquiera de estos otros medicamentos. Si toma estos medicamentos que paran la producción de ácido del estómago, debería tomar itraconazol cápsulas con una bebida gaseosa.

Consulte a su médico antes de tomar o si ya está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos. Puede ser necesario cambiar la dosis de itraconazol o de los otros medicamentos:

- Medicamentos para la ansiedad para ayudar a dormir (tranquilizantes), tales como buspirona, alprazolam o brotizolam.
- Medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer, tales como busulfán, docetaxel, trimetrexato y grupo de medicamentos conocidos como alcaloides de la vinca.
- Medicamentos para licuar la sangre (anticoagulantes) como warfarina.
- Medicamentos para la infección VIH, tales como ritonavir, indinavir y saquinavir. Son denominados inhibidores de la proteasa antiviral.
- Medicamentos para infecciones bacterianas como claritromicina y eritromicina.
- Medicamentos que actúan sobre el corazón y los vasos sanguíneos, como digoxina y disopiramida, cilostazol o bloqueantes de los canales del calcio tales como dihidropiridinas o verapamilo
- Medicamentos para la inflamación, asma o alergias (administrados por boca o inyección), tales como metilprednisolona, fluticasona, budesonida o dexametasona.
- Medicamentos que se utilizan usualmente después de un trasplante de órganos, tales como ciclosporina, tacrolimus y rapamicina. Otro nombre para rapamicina es sirolimus.
- Alfentanilo y fentanilo, para el dolor.
- Ebastina, para la alergia.
- Halofantrina, para la malaria.
- Reboxetina, para la depresión.
- Repaglinida, para la diabetes.
- Midazolam, para ayudar a relajarse o a dormir cuando se administra por vena.

**Tome siempre la dosis de ANTIFUX después de las comidas.**

### **Embarazo y lactancia**

No tome ANTIFUX I cápsulas si está embarazada a menos que su médico se lo indique. . Deben tomar medidas anticonceptivas adecuadas para asegurar que no se van a quedar embarazadas mientras están en tratamiento con este medicamento.

ANTIFUX permanece en el organismo durante algún tiempo después de la interrupción del tratamiento. Una vez acabado el tratamiento con itraconazol se debe continuar utilizando algún método anticonceptivo útil, hasta la siguiente menstruación. Consulte a su médico sobre que método anticonceptivo utilizar.

Si se queda embarazada después de empezar el tratamiento con ANTIFUX cápsulas, deje de tomarlo y consulte inmediatamente a su médico.

La lactancia debe ser suspendida si está tomando ANTIFUX cápsulas, dado que pequeñas cantidades del medicamento pasan a la leche materna. Consulte con su médico.

### Conducción y uso de máquinas

ANTIFUX cápsulas puede causar en ocasiones mareos, visión doble/borrosa o pérdida auditiva. Si tiene estos síntomas no conduzca ni use máquinas.

### ANTIFUX contiene sacarosa

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### VIA DE ADMINISTRACION: ORAL

ANTIFUX se debe tomar inmediatamente seguido de una comida para una óptima absorción.

### ADMINISTRACIÓN O POSOLOGÍA

#### *Frecuencia y duración del tratamiento:*

El número de cápsulas y la duración del tratamiento dependerán del hongo y localización de la infección. Su médico le indicará exactamente que dosis tiene que tomar.

La siguiente tabla indica alguna de las dosificaciones más frecuentes:

TIPO DE INFECCIÓN	CÁPSULAS POR DÍA	DURACIÓN
Infecciones vaginales	2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 2 veces al día ó	1 día
	2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 1 vez al día	3 días
Infecciones de la piel	2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 1 vez al día ó	7 días 15 días
	1 cápsula (100 mg de itraconazol) 1 vez al día	
	Si se ha formado una fina capa de piel callosa en la palma de las mano o en la planta del pie, se pueden necesitar 2 cápsulas (200 mg de itraconazol) dos veces al día durante 7 días o 1 cápsula (100 mg de itraconazol) una vez al día durante 1mes.	
Infecciones de la boca	1 cápsula (100 mg de itraconazol) 1 vez al día	15 días
Infecciones de órganos internos	Dosis mayores	Períodos más largos

Para infecciones de las uñas, dependiendo de sus necesidades personales su doctor optará por un tratamiento continuo o intermitente:

TIPO DE INFECCIÓN	CÁPSULAS POR DÍA	DURACIÓN
Tratamiento continuo para uñas	2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 1 vez al día	3 meses

Tratamiento intermitente para uñas	Semana 1	S 2	S 3	S 4	Semana 5	S 6	S 7	S 8	Semana 9	Semana 10
Uñas de los pies con/sin afectación de las uñas de las manos	2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 2 veces al día	No itraconazol			2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 2 veces al día	No itraconazol			2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 2 veces al día	Suspenda el tratamiento
Solo uñas de las manos	2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 2 veces al día	No itraconazol			2 cápsulas (200 mg de itraconazol) 2 veces al día	Suspenda el tratamiento				

*Cuando debe esperar los resultados:*

El efecto del medicamento no es inmediato.

En infecciones de piel, las lesiones normalmente desaparecen en unas pocas semanas después de suspender el tratamiento. Esto es característico de las lesiones fúngicas ya que el medicamento eliminará el hongo pero las lesiones permanecerán hasta que la nueva piel crezca.

Las lesiones de las uñas desaparecerán de seis a nueve meses después de terminar el tratamiento, ya que el medicamento eliminará el hongo pero el crecimiento de la nueva uña tarda varios meses.

No se preocupe si usted no nota mejoría durante el tratamiento.

El medicamento se mantiene en sus uñas durante varios meses y cumple su misión.

Debe de interrumpir el tratamiento en el momento que le indique su médico aunque usted no vea ningún signo de mejoría.

Para infecciones de órganos internos se pueden necesitar dosis más altas y durante mucho tiempo.

No olvide tomar su medicamento.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le indique otra cosa.

Su médico le dirá durante cuanto tiempo debe tomar ANTIFUX

No interrumpa el tratamiento antes de que se lo indique su médico o puede que no se cure completamente.

**SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL**

Informe inmediatamente a su médico si ha tomado más ANTIFUX del que debiera.

En caso de sobredosis o ingestión accidental debe realizarse una gastroclisis con bicarbonato de sodio. El itraconazol no es dializable. Acudir inmediatamente al centro de Salud más cercano.

**Si olvido tomar itraconazol ANTIFUX:**

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi el momento de la siguiente dosis, sáltese la dosis olvidada y siga su programa de dosificación normal. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

**POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, ANTIFUX puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar ANTIFUX cápsulas y consulte a su médico inmediatamente si nota o sospecha cualquiera de los siguientes efectos. Puede necesitar tratamiento médico urgente:

- Signos repentinos de alergia tales como urticaria, irritación severa de la piel, hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo. Esto puede ser signo de una reacción alérgica grave. Esto solo ocurre en un número muy pequeño de gente.
- Alteraciones de la piel grave con descamación y/o urticaria con pequeñas pústulas (con fiebre) o formación de ampollas en la piel, boca, ojos y genitales, con fiebre, escalofríos, dolor muscular y en general no encontrarse bien (la frecuencia precisa de cómo estos efectos pueden ocurrir no se conoce).
- Sensación de hormigueo, entumecimiento o debilidad en las extremidades (la frecuencia precisa de cómo estos efectos pueden ocurrir no se conoce).
- Falta severa de apetito, se siente enfermo (náuseas), está enfermo (vómitos), se siente inusualmente cansado, con dolor abdominal, debilidad muscular, color amarillo de la piel y del blanco de los ojos, orina inusualmente oscura, heces pálidas o caída de cabello. Pueden ser signos de un problema hepático. Esto solo ocurre en un número muy pequeño de gente.
- Falta de respiración, ganancia de peso de forma inesperada, piernas hinchadas, se siente inusualmente fatigado o comienza a despertarse por la noche. Estos pueden ser signos de insuficiencia cardíaca. La falta de respiración puede ser también un signo de líquido en los pulmones (esto solo ocurre en un número muy pequeño de gente).

Consulte a su médico o farmacéutico si nota alguno de los siguientes efectos adversos:

*Frecuentes (afecta a menos de 1 en 10 personas):*

Dolor de estómago y sentirse enfermo (náuseas).

*Poco frecuentes (afecta a menos de 1 en 100 personas):*

Problemas menstruales.

Dolor de cabeza, mareos

Estreñimiento, diarrea, gases, estar enfermo (vómitos), indigestión, alteración del gusto.

Hinchazón debida a presencia de fluido bajo la piel.

Pérdida o disminución inusual del cabello (alopecia).

Piel roja, con picor, descamación o desprendimiento.

*Raros (afecta a menos de 1 en 1000 personas):*

Incremento en los test de función hepática (mostrados por análisis de sangre).

Ciertas alteraciones sanguíneas, las cuales pueden incrementar el riesgo de hemorragia, dolor o infección

Zumbido de oídos.

Dolor severo en la parte superior del estómago, a menudo con náuseas y vómitos.

Fiebre o alta temperatura.

Los siguientes efectos adversos han sido notificados, si embargo la frecuencia precisa no se puede identificar y por lo tanto la frecuencia con la que ocurren se clasifica como desconocida:

Niveles de triglicéridos en sangre altos (mostrados por análisis de sangre).

Dolor muscular y dolor de articulación.

Dificultad en la erección.

Sensibilidad de la piel a la luz.

Pérdida de audición (puede ser permanente).

Niveles bajos de potasio en sangre (mostrados por análisis de sangre).

Pérdida de orina inesperada o necesidad de orinar más frecuentemente,

Problemas con la vista, incluyendo visión borrosa o visión doble.

## **VENTA BAJO RECETA MÉDICA**

### **RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO**

**Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.**

**Conservar a temperatura no mayor a 30°C.**

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase

No utilice este medicamento si tiene signos visibles de deterioro.

### **PRESENTACIÓN**

ANTIFUX Caja x 14 cápsulas

ANTIFUX Caja x 2 cápsulas Muestra Médica

ELABORADO POR QUALIPHARM LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A QUITO – ECUADOR

PARA FARMTRADING INTERNACIONAL S.A. QUITO – ECUADOR

FARMACÉUTICO RESPONSABLE VICTOR COBA