

CIFLOBAC 500®

COMPOSICIÓN

Cada Comprimido Recubierto contiene:

Ciprofloxacino 500 mg.

Excipientes: Almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, laca aluminica amarilla, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, polietilenglicol 6000, talco, alcohol etílico y agua para uso farmacéutico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibiótico de amplio espectro

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones bacterianas urinarias, tracto respiratorio (sinusitis aguda), gastrointestinales (por salmonellas, typhi, diarrea del viajero, brucelosis sistémica), infecciones de la piel y tejidos blandos, de los huesos y articulaciones, en otras infecciones como gonorrea, chancro.

CONTRAINDICACIONES

CIFLOBAC está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al ciprofloxacino y a otras quinolonas terapéuticas, y/o a los componentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS

Se debe evitar su uso en: Tendinitis, ruptura de tendones y el empeoramiento de la miastenia gravis, riesgos de la neuropatía periférica y efectos sobre el sistema nervioso central, afectaciones cardíacas, dermatológicas y reacciones de hipersensibilidad; además el consejo de los beneficios para los pacientes con sinusitis bacteriana aguda (ABS), exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis crónica (ABECB) y las infecciones del tracto urinario no complicadas (UTI) que tienen otras opciones de tratamiento. No administrar a niños o adolescentes o mujeres embarazadas, o en periodo de lactancia. Hipersensibilidad al ciprofloxacino o a cualquiera de sus componentes.

Se podrían presentar niveles bajos de azúcar en sangre, también llamados hipoglucemia, puede llevar al coma.

Embarazo y lactancia

Es preferible evitar el uso de CIFLOBAC durante el embarazo. Informe a su médico si planea quedarse embarazada.

No tome CIFLOBAC durante el periodo de lactancia, ya que ciprofloxacino se excreta a través de la leche materna y puede producir daño en su bebé.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Informe al médico si está tomando los siguientes medicamentos:

- Medicamentos utilizados para la diabetes como Glimpirida, glibenclamida (Glibenclamida), glipizida, gliclazida
- Warfarina u otros anticoagulantes orales (para diluir la sangre)
- Probenecid (para la gota)
- Metotrexato (para ciertos tipos de cáncer, psoriasis, artritis reumatoide)
- Teofilina (para problemas respiratorios)

- Tizanidina (para la espasticidad muscular en la esclerosis múltiple)
- Clozapina (un antipsicótico)
- Ropinirol (para la enfermedad de Parkinson)
- Fenitoína (para la epilepsia)

Ciflobac puede **aumentar** los niveles en sangre de los siguientes medicamentos: pentoxifilina (para trastornos circulatorios) y cafeína

El uso concomitante con un antiinflamatorio no esterooidal puede incrementar el riesgo de estimulación del sistema nervioso y provocar convulsiones.

Algunos medicamentos **disminuyen** el efecto de CIFLOBAC. Informe a su médico si está tomando o desea tomar: sucralfato, antiácidos con aluminio o magnesio, suplementos minerales o multivitamínicos que contengan hierro, calcio o zinc. Si estos medicamentos son imprescindibles tome CIFLOBAC aproximadamente **dos** horas antes o **cuatro** horas después de que haya tomado estos medicamentos.

EFFECTOS ADVERSOS

En general CIFLOBAC es bien tolerado siendo la incidencia de las reacciones adversas graves inferior al 5%

En un 10% se han comunicado efectos gastrointestinales como náuseas y vómito, diarrea y dolor abdominal; siendo más frecuente en la tercera edad y con dosis más elevadas.

En menor porcentaje puede haber un aumento de la presión intracraneal y psicosis tóxica con todas las quinolinas incluyendo ciprofloxacino.

Se han documentado varios casos de ruptura del tendón de Aquiles después del tratamiento con ciprofloxacino. Pueden ocurrir en casos raros síntomas anafilácticos como colapso circulatorio.

En pacientes que estén usando medicamentos para la diabetes por la baja de niveles de azúcar en sangre se presentan disturbios en la atención, desorientación, agitación, deterioro de la memoria, graves alteraciones en las habilidades mentales llamadas delirio, confusión taquicardia, mareo, palidez, temblor, transpiración, hambre inusual, dolores de cabeza, debilidad, irritabilidad y ansiedad inusual.

POSOLOGÍA

Administración por vía ORAL

Adultos 1 comprimido 500 mg. cada 12 horas durante 7 a 14 días.

En caso de infecciones muy graves la misma dosis puede administrarse cada 8 horas

O puede ajustarse su administración y el tiempo de tratamiento de acuerdo a lo que su médico señale.

PRECAUCIONES DE USO

En caso de sobredosificación el paciente deberá ser observado cuidadosamente y se deben administrar medidas generales de soporte, en especial se mantendrá una adecuada hidratación. La hemodiálisis puede remover únicamente una pequeña fracción (10%) del fármaco del organismo.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

PRESENTACIÓN

CIFLOBAC 500: Caja x 1 blíster con 10 comprimidos recubiertos.

Caja x 1 blíster con 2 comprimidos recubiertos (Muestra Médica)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Elaborado por: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A., Quito -Ecuador
Para FARMTRADING INTERNACIONAL S.A.
Quito- Ecuador
Farmacéutico Responsable: Víctor Coba